

PRIMER REGISTRO DE *STERNA SANDVICENSIS EURYGNATHA* PARA CUBA

ENEIDER PÉREZ¹, PATRICIA RODRÍGUEZ¹, DAYSI RODRÍGUEZ¹,
ALAIN PARADA², OMILCAR BARRIOS³, Y EDWIN RUIZ⁴

¹Instituto de Ecología y Sistemática, CITMA, Ciudad de la Habana, Cuba; ²Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros, CITMA, Ciego de Ávila, Cuba; ³Flora y Fauna, MINAGRI, Camaguey, Cuba; ⁴Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales, CITMA, Villa Clara, Cuba

Resumen.— En Cayo Felipe de Barlovento fue encontrado nidificando un individuo de *Sterna sandvicensis eurygnatha* dentro de una colonia de *S. s. aciflavida*. Este hecho constituye el primer registro de la subespecie para Cuba y su observación más al norte dentro de su rango de distribución en el Caribe.

Palabras claves: Cuba, primer registro, *Sterna sandvicensis eurygnatha*

Abstract.— FIRST RECORD OF *STERNA SANDVICENSIS EURYGNATHA* FOR CUBA. We found a breeding individual of Cayenne Tern (*Sterna sandvicensis eurygnatha*) associated with a nesting colony of Sandwich Terns (*S. s. aciflavida*) on Felipe de Barlovento Key. This represents the first report of the subspecies for Cuba and the northernmost observation for the subspecies in the Caribbean.

Key words: Cuba, first record, *Sterna sandvicensis eurygnatha*

LA GAVIOTA DE SANDWICH (*Sterna sandvicensis*) tiene tres subespecies: (1) *S. s. sandvicensis* se localiza en Eurasia; (2) *S. s. aciflavida* se distribuye por casi toda la costa atlántica de América, Bahamas, Antillas Mayores y Menores (Harrison 1983, Shealer 1999), y (3) *S. s. eurygnatha*, se encuentra distribuida por la costa este de Sur América y el Mar Caribe (Harrison 1983, Shealer 1999, Norton 2000). En el Mar Caribe, *S. s. eurygnatha* ha sido registrada nidificando en las Antillas Mayores de Puerto Rico e Islas Vírgenes, y en las Antillas Menores (Norton 2000, Shealer 1999), donde se encuentran parejas mixtas con *S. s. aciflavida* (Norton 1984, Schaffner *et al.* 1986, Shealer 1999, Hayes 2004); aunque existen algunos registros de *S. s. eurygnatha* en la costa atlántica de América, fuera de su rango de distribución (Hayes 2004).

En Cuba la Gaviota de Sandwich fue registrada desde 1893 (Gundlach 1893) y Garrido y García (1975) determinaron que la subespecie cubana era *S. s. aciflavida*. En la actualidad esta gaviota es considerada como un común residente de verano y transeúnte (Garrido y Kirkconnell 2000).

En cayo Felipe de Barlovento localizado al norte de Ciego de Ávila en el Archipiélago Sabana-Camagüey (22°36'41"N, 78°37'27"W), el 25 de junio de 2002 se observó y fotografió un individuo de Gaviota de Sándwich más corpulento con el pico completamente amarillo, características estas que coinciden con la descripción de la subespecie *eurygnatha* (Fig. 1). Este avistamiento constituye el pri-

mer reporte de *S. s. eurygnatha* para Cuba y es el registro de nidificación más al norte de su rango de distribución en el Caribe.

El individuo se encontraba nidificando con un pequeño grupo de *S. s. aciflavida* y *S. maxima* que formaba parte de una colonia mixta que incluía otras especies de láridos como *S. fuscata*, *S. anaethetus*, *Anous stolidus* y *Larus atricilla*. La presencia de este individuo pudiera sugerirnos el establecimiento de una pareja reproductiva de *S. s. eurygnatha* o una posible hibridación entre ambas subespecies como plantean otros observadores (Norton 1984, Schaffner *et al.* 1986, Shealer 1999, Hayes 2004), hecho que por falta de tiempo no pudimos corroborar.

LITERATURA CITADA

- GARRIDO, O. H., Y F. GARCÍA. 1975. Catálogo de las aves de Cuba. Ed. Academia de Ciencias de Cuba.
- GARRIDO, O. H., Y A. KIRKCONNELL. 2000. Field guide to the birds of Cuba. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- GUNDLACH, J. 1893. Ornitología Cubana. Habana, Cuba: Imprensa La Moderna.
- HARRISON, P. 1983. Seabirds: an identification guide. Houghton Mifflin Company Boston, Massachusetts.
- HAYES, F. E. 2004. Variability and interbreeding of Sandwich Terns and Cayenne Terns in the Virgin

Islands, with comments on their systematic relationship. *North Amer. Birds* 57:566-572.

NORTON, R. L. 1984. Cayenne × Sandwich terns nesting in the Virgin Islands, Greater Antilles. *J. Field Ornithol.* 55:243-246.

NORTON, R. L. 2000. Status and conservation of Sandwich and Cayenne terns in the West Indies. Pp. 80-86 in *Status and Conservation of West Indian Seabirds* (E. A. Schreiber and D. S. Lee,

eds.). Society of Caribbean Ornithology, Special Publication #1.

SCHAFFNER, F. C., R. L. NORTON, AND J. TAYLOR 1986. Range extension of Cayenne Terns on the Puerto Rico Bank. *Wilson Bull.* 98:317-318.

SHEALER, D. 1999. Sandwich Tern (*Sterna sandvicensis*). No. 405 in *The Birds of North America* (A. Poole and F. Gill, eds.). Philadelphia, PA: The Birds of North America, Inc.



Fig. 1. Individuo de *S. sandvicensis eurygnatha* encontrado nidificando en Cayo Felipe de Barlovento, Cuba, dentro de una colonia de *S. s. acufilavida*.