

PREMIERE MENTION DE L'ENGOULEVENT DE GUNDLACH
(*CHORDEILES GUNDLACHII*) EN GUADELOUPE

ANTHONY LEVESQUE

AEVA (Association pour l'Etude et la protection des Vertébrés et des végétaux des petites Antilles), 26, Cité Bellemont - 97114 Trois Rivières – French West Indies. E-mail: anthony.levesque@wanadoo.fr

Résumé.— Un Engoulevent de Gundlach a été entendu le 21 juin 2000 et vu le lendemain près de Baie-Mahault sur l'île de Basse Terre en Guadeloupe. Le chant a été enregistré 4 jours plus tard, confirmant ainsi la première apparition de l'espèce en Guadeloupe. L'observation de 2 individus ensemble le 16 juillet 2000 indique que l'espèce pourrait nicher en Guadeloupe.

Mots-clés: *chant, Chordeiles gundlachii, engoulevent, l'Engoulevent de Gundlach, nidification, petites antilles*

Abstract.—FIRST CONFIRMED RECORD OF ANTILLEAN NIGHTHAWK (*CHORDEILES GUNDLACHII*) ON GUADELOUPE. An Antillean Nighthawk was heard on 21 June 2000 near Baie-Mahault on Basse Terre, Guadeloupe, and seen the following day. Four days later, its vocalizations were tape recorded, which provides documentary evidence for the first occurrence of this species on Guadeloupe. Two individuals of this species observed together on 16 July 2000 raise the possibility that breeding may occur on Guadeloupe.

Key words: *Antillean Nighthawk, Chordeiles gundlachii, Lesser Antilles, nesting, nighthawk, song*

LE 21 JUIN 2000 à Destrelan (Baie-Mahault), environ une heure après la tombée de la nuit (soit approximativement 20h), Marie-Eve Jaffard et moi-même entendions très clairement un chant d'engoulevent haut dans le ciel. Connaissant déjà ce chant pour l'avoir entendu l'année précédente en République Dominicaine, nous le rapportons sans hésiter à l'Engoulevent de Gundlach (*Chordeiles gundlachii*). Le lendemain, l'oiseau apparaissait sur le même site un peu avant la nuit (à 18h48) et était observé par intermittence jusqu'à 19h10.

L'oiseau avait une allure typique d'engoulevent et était très élané, un peu à la manière d'un Crécerelle d'Amérique (*Falco sparverius*), d'une teinte générale brune, semblant plus claire dessous que dessus. Trois tâches blanches étaient très distinctes, l'une à chaque aile près de l'extrémité des rémiges primaires, l'autre sous la gorge. La queue était légèrement fourchue. Le vol était rapide et direct, parfois entrecoupé de piqués soudains. Tous ces critères confirmaient que nous étions bien en présence d'un engoulevent. Mais, sur le terrain, ces seuls critères anatomiques ne permettent pas la diagnose entre l'Engoulevent d'Amérique (*Chordeiles minor*) et l'Engoulevent de Gundlach (Raffaele *et al.* 1998), et seul le chant nous permet d'affirmer qu'il s'agissait de l'Engoulevent de Gundlach.

Ce chant était un rapide «quérébété» répété très régulièrement et audible de loin alors que l'oiseau était parfois à peine visible. Il a été enregistré le 25 juin au soir à l'aide d'un magnétophone.

L'oiseau a été revu régulièrement, dans les mêmes conditions d'observation, jusqu'au 13 août, date du dernier contact avec l'espèce. Le 16 juillet, 2 individus étaient vus ensemble, se poursuivant pendant au moins 5 minutes. La présence d'un oiseau pendant près de 2 mois, et l'observation d'un deuxième individu le 16 juillet, laissent penser qu'un couple pourrait avoir niché, ce qui n'a encore jamais été signalé en Guadeloupe.

Par ailleurs, ce même 16 juillet au soir, Daniel Imbert (comm. pers.) a identifié un oiseau de cette espèce, notamment grâce au chant, au lieu dit «Belle Plaine» sur la commune d'Abymes, à environ 7.5 km du premier site. Trois individus différents ont donc été observés au cours de cette année.

Rétrospectivement, on peut penser que l'observation de 2 engoulevents non identifiés (*Chordeiles* sp.) le 5 août 1998, à Pierrefite, commune de Morne à l'Eau, par Pascal Villard (comm. pers.), pourrait également correspondre à cette espèce, car l'Engoulevent d'Amérique semble ne migrer que plus tard en saison (Raffaele *et al.* 1998).

L'Engoulevent de Gundlach niche de mai à août aux Bahamas, dans les Grandes Antilles et aux îles Vierges; il hivernerait en Amérique du Sud (Raffaele *et al.* 1998). Selon ces auteurs, il serait rare en migration dans les Petites Antilles; toutefois, aucune observation ne semble être authentifiée dans les Petites Antilles avant celle réalisée à Barbade le 17 mai 2000 (Frost 2000).

Le statut de *C. gundlachii* dans les Petites Antilles

est partiellement obscurci par de possibles confusions avec *C. minor*. Des oiseaux pourraient être à la recherche de nouveaux sites de nidification suite à des incidents climatiques. Le cyclone «George», qui a eu un fort impact sur les milieux naturels de la République Dominicaine en 1998, pourrait ainsi être à l'origine de certaines observations récentes de cette espèce dans les Petites Antilles (Philippe Feldmann, comm. pers.).

BIBLIOGRAPHIE

- FROST, M. 2000. An observation of an Antillean Nighthawk (*Chordeiles gundlachii*) on Barbados. *Pitirre* 13(3):90.
- RAFFAELE, H., J. WILEY, O. GARRIDO, A. KEITH, AND J. RAFFAELE. 1998. A guide to the birds of the West Indies. London: Helm.