

PRIMERA CAPTURA DEL VENCEJO DE CHIMENEA (*CHAETURA PELAGICA*)
(AVES: APODIDAE) PARA CUBA

ALEJANDRO LLANES SOSA Y ENEIDER E. PÉREZ MENA
Instituto de Ecología y Sistemática, Carretera de Varona Km 3 1/2,
A.P. 8029, C.P. 10800, Boyeros, Ciudad de La Habana, Cuba

Resumen.—Dos especímenes de Vencejo de Chimenea (*Chaetura pelagica*) fueron colectados y otros observados en el faro Roncali, Cabo de San Antonio, Península de Guanahacabibes, Cuba, entre el 20 y el 24 de Octubre de 1998. Estos especímenes, son los primeros colectados en Cuba

Abstract.—FIRST CAPTURE OF THE CHIMNEY SWIFT (*CHAETURA PELAGICA*) (AVES: APODIDAE) FOR CUBA. Two specimens were collected and others were observed at the Roncali lighthouse, Cabo de San Antonio, Guanahacabibes Peninsula, Cuba, 20-24 October 1998. The specimens are the first collected in Cuba.

CHAETURA PELAGICA, CONOCIDA en Norte América con el nombre común de Chimney Swift y en Cuba por el de Vencejo de Chimenea, es un ave que nidifica en el Sureste de América del Norte, al Este de las Montañas Rocallosas e inverna en el occidente y en la parte alta de la cuenca del Amazonas del oriente del Perú, Norte de Chile y Noreste de Brasil (American Ornithologists' Union 1983).

En Cuba, la presencia del Vencejo de Chimenea no había sido corroborada con la colecta de algún ejemplar y hasta el presente, sólo se reportó visualmente por la presencia de dos bandos en el litoral Habanero: uno el 13 de Octubre de 1964 y el otro el 29 de Septiembre de 1998 (Orlando Garrido, com. pers.). Además, esta especie ha sido incluida para nuestro territorio, según Garrido y Kirkconnell (1993) en la categoría de raro transeúnte y por Raffaele *et al.* (1998) como un ave migratoria muy rara.

En una expedición realizada al faro de Roncali en el Cabo de San Antonio, Península de Guanahacabibes; desde el 13 hasta el 26 de Octubre de 1998, se observaron dos Vencejos de Chimenea, forrajeando a una altura de 4 m en los alrededores del faro, los días 20 y 24 de Octubre de 1998, respectivamente. En la

mañana del 22 de Octubre, con la llegada de miles de aves del orden Passeriformes, capturamos dos individuos de esta especie, descansando en la base del faro, presumiblemente agotados por el vuelo de migración a través del Golfo de México, los mismos se colectaron y se depositaron en la colección de aves del Instituto de Ecología y Sistemática, con los números 2433 y 2434 (Tabla 1). Estos ejemplares constituyen el primer récord de la captura de esta especie para Cuba.

LITERATURA CITADA

- AMERICAN ORNITHOLOGISTS' UNION. 1983. Checklist of North American birds. Sixth edition. Amer. Ornith. Union, Lawrence, Kansas.
- GARRIDO O. Y A. KIRKCONNELL. 1993. Checklist of Cuban birds. Reunión Anual de la Sociedad Caribeña de Ornitología, Ciénaga de Zapata, Matanzas, Cuba.
- RAFFAELLE H, J. WILEY, O. GARRIDO, A. KEITH, AND J. RAFFAELE. 1998. A guide to the birds of the West Indies. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

Tabla 1. Medidas morfométricas de dos individuos del Vencejos de Chimenea (*Chaetura pelagica*) capturados el 22 de octubre de 1998, en el faro de Roncali, Cabo de San Antonio, Península de Guanahacabibes, Cuba.

Ejemplare no.	Medidas					Sexo
	Ala (mm)	Pico (mm)	Tarso (mm)	Cola (mm)	Peso (g)	
2433	129	4.1	11.1	41	24.5	Indeterminado
2434	126	3.4	11	40	20.5	Hembra