

CACATUA ALBA — NUEVO INFORME PARA PUERTO RICO

RAUL A. PÉREZ-RIVERA

Departamento de Biología, Universidad de Puerto Rico, Humacao, Puerto Rico 00791

EN PUERTO RICO SE HAN INFORMADO tres especies de cacatúas. A saber: *Cacatua moluccensis*, *C. sulphurea* y *C. goffini* (Pérez-Rivera 1992, 1993). El 16 de noviembre de 1996, mis estudiantes del curso de ornitología y yo observamos, por unos 15 minutos y a una distancia de aproximadamente 30 m, a una cacatúa blanca en los terrenos del Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras. De esta ave no hay pieles ni fotografías en el Colegio Universitario de Humacao, por lo que no estábamos familiarizados con la misma. El plumaje en general del individuo era blanco, incluyendo la cresta, y las plumas interiores de las alas y las inferiores del rabo, amarillas. El pico y las patas eran gris oscuro. El individuo era robusto y medía aproximadamente 45 cm. El próximo día al consultar la literatura y examinar una ilustración (Forshaw y Cooper, 1977) pude identificar al ave positivamente como *Cacatua alba*.

El 8 de octubre de 1997, visité el zoológico de Mayagüez (Zoorico). En el área había varios psitácidos sueltos y cuando inferí sobre los mismos, uno de los curadores (Sr. Cuevas) me indicó que llevaban varios años en el lugar y que habían logrado capturar algunas de estas incluyendo una cacatúa blanca. La misma fue capturada a mediados de 1995. Pedí que me mostraran el ave y, ya familiarizado con la especie, pude constatar entonces que se trataba de un individuo de *Cacatua alba*.

El 27 de marzo de 1998 observé por unos 20 minutos a otra de estas aves en la Urbanización Bairoa Park de Caguas. La misma estuvo alimentándose de flores de roble (*Tabebuia heterophylla*) hasta que fue atacada por una pareja de Falconcitos (*Falco sparverius*). El ave contestó a cada una de las investidas levantando su cresta inmaculadamente blanca. Poco después el ave levantó vuelo y se cobijó en una cercana palma de cocos (*Cocos nucifera*). En dicha localidad comenzó a comerse los coquitos que estaban comenzando a formarse. Esta cacatúa blanca era totalmente dócil, y se dejó observar a menos de 10 m de distancia. Al moverse a través de la palma

puede observar el color amarillo de las cobijas inferiores del rabo y de la parte interior de una de sus alas. Presumo que era un individuo macho porque los ojos eran color pardo oscuro. Asumo también que hacía muy poco que había escapado del cautiverio ya que tenía algunas primarias chamuscadas y le faltaban plumas en el abdomen. El área desnuda permitía observar su piel color gris oscuro.

La Cacatua Blanca es oriunda de Obi, Batjan, Halmahera, Ternate y Tidore en la Indonesia (Forshaw y Cooper 1977, Clements 1992) y no ha sido previamente informada en el estado silvestre en Puerto Rico (Raffaele 1989; Pérez-Rivera 1992, 1993; Biaggi 1996; Pérez-Rivera y Claudio 1997). Esta ave aparentemente está siendo introducida ilegalmente en la Isla, ya que no aparece en la lista de aves permitidas por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico. Los individuos solitarios observados, parecen ser el resultado de escapes accidentales.

LITERATURA CITADA

- BIAGGI, V. 1997. Las aves de Puerto Rico. 4th ed. Editorial Universitaria. Universidad de Puerto Rico, Río Piedras.
- CLEMENTS, J. F. 1992. Birds of the world: a check list. 4th ed. Ibis Pub. Co., Vista, California.
- FORSHAW, J. M. y W. T. COOPER. 1977. Parrots of the world. T.F.H. Publications. Neptune, New Jersey.
- PÉREZ-RIVERA, R. A. 1992. Feral exotic psittaciformes from Puerto Rico. *Ornitología Caribeña* 3:30-34.
- PÉREZ-RIVERA, R. A. 1993. Lista de cotejo de las aves de Puerto Rico. *Exegesis* 6(17):6-14.
- PÉREZ-RIVERA, R. A. y P. CLAUDIO. 1997. Sobre el status de la Cacatúa de Goffin (*Cacatua goffini*) en Puerto Rico. *El Pitirre* 10(2):54-55.
- RAFFAELE, H. A. 1989. A guide to the birds of Puerto Rico and the Virgin Islands. Princeton University Press. Princeton, New Jersey.