

indicó al primer autor de la presencia de cacatúas en las cercanías del Bosque de Piñones. El 1 de diciembre, se visitó la localidad y se observaron a dos individuos (lo que aparenta ser una pareja) de Cacatúa de Goffin entrando y saliendo de una palma de coco (*Cocos nucifera*) rota y con un hueco en la parte superior. Un tercer individuo fue observado bastante distante de los otros dos y por poco tiempo. Este parecía algo más grande que los dos primeros y tenía una cresta amarillenta por lo que se presume que pertenezca a la especie *Cacatua sulphurea*.

Un hecho curioso es que tanto Iglesias (en Piñones) como Claudio (en la Plata) han observado a las Cacatúas de Goffin, pernoctar en colonias de garzas ganaderas en donde pasan virtualmente despersividas.

Al presente existen al menos tres grupos de estas aves en diferentes localidades de Puerto Rico. La evidencia, aunque circunstancial, tiende a indicar que esta ave se ha hecho residente de la Isla.

Agradecimiento.—Se agradece la información suministrada por Juan Iglesias y Manuel Corbet.

LITERATURA CITADA

- FORSHAW, J. M. y W. T. COOPER. 1977. Parrots of the world. T. F. H. Publications. Neptune, N. J.
PÉREZ-RIVERA, R. A. 1992. Feral exotic Psittaciformes from Puerto Rico. *Ornitología Caribeña* 3:30-34.

SICALIS FLAVEOLA (AVES: EMBERIZIDAE)—NUEVA ESPECIE PARA LA AVIFAUNA CUBANA

ORLANDO H. GARRIDO

Museo Nacional de Historia Natural, Capitolio Nacional, La Habana, Cuba

MIGUEL FERNÁNDEZ, AMIGO DE LA CASA, me comentó sobre un ave que tenían dos amigos suyos (aficionados a las aves), que nadie la conocía. Interesado por la noticia, les hice llamar, personándose en mi casa con el referido pájaro, Francisco Tejera y Juan Sarracino. El ave en cuestión resultó ser un macho adulto en perfecto plumaje de *Sicalis flaveola* (Linnaeus), conocido en Inglés como Saffron Finch. Mostraba un viso de tono anaranjado en la cabeza y presentaba los costados del pico desplumados a causa de sus intentos de huida en cautiverio. El ave, aún mostraba síntomas de inquietud y nerviosidad, lo que evidenciaba que aún no se había adaptado al cautiverio.

Fue atrapada en el mes de octubre con jaula de trampa y señuelo al sur de Guantánamo (provincia de Guantánamo), en el extremo oriental de la isla, por un "pajarrero" local quien dice se hallaba entre un bando de Tomeguines del Pinar (*Tiaris canora*), ave relativamente abundante en las zonas costeras y semixerofíticas del sur de la provincia de Guantánamo.

Esta especie, oriunda de Sur América, ha sido introducida en las islas Hawaii, Panamá (Zona del Canal), Jamaica y Puerto Rico (American Ornithologists' Union 1983). Este hallazgo, constituye de hecho, el primer reporte oficial para Cuba. Es posible que su arribo, y eventual asentamiento en la isla, se halla producido de la vecina isla de Jamaica donde es común. La zona donde fue atrapada, coincide perfectamente con el hábital señalado para esta especie (Downer y Sutton 1990:152).

¿Cómo arribó a nuestra isla? Constituye un motivo de especulación, pero imagino pudo haberlo hecho al igual que *Lonchura malacca*, reportado sólo de pocos años atrás, y actualmente bien establecido en varias zonas de Cuba.

También reportado recientemente de Jamaica (Catherine Levy, com. pers.) ambas especies fueron introducidas originalmente en Puerto Rico (Raffaele 1983). Por el momento, el individuo será mantenido vivo en cautiverio y posteriormente, donado al Museo Nacional de Historia Natural. Como es lógico, esta especie aún no ha sido bautizada con nombre vulgar en Cuba, por lo que propongo denominarla, Gorrión Amarillo.

Como nota adicional interesante, Tejera y Sarracino me comentaron, que en los entornos de Vilorio (pueblo de la provincia de Guantánamo), se halla establecida otra especie de ave que incluso se ha observado nidificando. Construye grandes nidos globosos semejantes a los del Tomeguín (*Tiaris*). Ellos le llaman "Tablero," e incluso con anterioridad, habían traído dos individuos que murieron en cautiverio. Identificados por el libro de Raffaele (1983: Lám. 40), aparentemente esta especie ha de ser el Scaly-breasted Mannikin (*Lonchura punctulata*). El autor ha observado esta especie, así como su nido, en "El Dorado," Puerto Rico.

Mi agradecimiento a los tres mencionados colegas, sobre todo por el interés mostrado en continuar su colaboración en el futuro.

LITERATURA CITADA

- AMERICAN ORNITHOLOGISTS' UNION. 1983. Check-list of North American birds. 6th edition. A.O.U., Washington, D.C.
DOWNER, A., AND R. SUTTON. 1990. Birds of Jamaica. A photographic guide. Cambridge University Press.
RAFFAELE, HERBERT A. 1983. A guide to the birds of Puerto Rico and the Virgin Islands. Fondo Educativo Interamericano, Río Piedras, Puerto Rico.